



C:NR34

5	المعامل:	علوم الحياة والأرض	المادة:
3	مدة الإنجاز:	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعب(ة) أو المسلك:

النقط	عناصر الإجابة	رقم السؤال
	<p>التمرين الأول (4 نقط)</p> <p>يتضمن العرض العناصر التالية:</p> <p>- <u>آثار النفايات المنزلية على البيئة ، 4 أمثلة على الأقل من قبيل:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> يتسبب إحراق النفايات المنزلية في المطارح غير المراقبة في انبعاث غازات سامة (مركبات عضوية طيارة، الديوكسين ...) تساهم في الاحتباس الحراري وتدمير الأوزون؛ ينجم عن ترميد هذه النفايات عدة مواد سامة تلحق أضرارا بالبيئة مثل الاحتباس الحراري؛ تراكم النفايات في المطارح يؤدي إلى تخمرها و بالتالي إصدار غازات سامة تساهم في تدمير طبقة الأوزون و في الاحتباس الحراري كما ينتج عن ترشيح مياه الأمطار عبر النفايات سائل اللكسيفيا المحمل بملوثات عضوية وملوثات معدنية، تتسرب هذه المواد الملوثة إلى التربة و المياه الجوفية؛ ينتج عن تراكم هذه النفايات في غياب تجميعها في المدن عرقلة للسير بالإضافة إلى انسداد قنوات الصرف الصحي كما أن النفايات غير المجمععة في الشوارع تعطي روائح كريهة تساهم في تدهور هواء المدن؛ يسبب إحراق النفايات المنزلية في المطارح غير المراقبة انبعاث غازات سامة (NO و NO₂ و CO <p>2 ن (CO₂) تساهم في الاحتباس الحراري و تدمير طبقة الأوزون .</p> <p>- <u>آثار النفايات المنزلية على الصحة .</u> مثالين من قبيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> تشكل الغازات السامة الناتجة عن إحراق و ترميد النفايات المنزلية تهديدا لصحة الإنسان؛ المركبات العضوية الطيارة تسبب مشاكل تنفسية، و تهدد بالإصابة بالسرطان؛ - الديوكسين يعتبر مادة مسرطنة ويؤثر على وظائف أجهزة الجسم؛ - غازات CO₂ و N₀ تسبب أزمات تنفسية خصوصا عند المصابين بالربو؛ انتشار الجراثيم وتكاثر الحشرات يهدد بظهور وانتشار الأمراض . <p>1 ن</p> <p>- <u>تقنيات معالجة النفايات المنزلية:</u> قبول تقنيتين من بين ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> تقنية إنتاج السماد العضوي المتمثلة في المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية. تقنية إنتاج غاز إحيائي المتمثلة في معالجة المواد العضوية في ظروف لا هوائية، هذا الغاز قابل للاشتعال يحتوي على أزيد من 50% من غاز الميثان. تقنية الترميد التي تهدف إلى تخفيض حجم النفايات والحصول على طاقة و مواد حثالية تستعمل في الأشغال العمومية. <p>1 ن</p>	

التمرين الثاني (6 نقط)

0.25 ن	<p>I-1 توجد أربعة أشكال من الجبرلين عند نبتة الجلبان ذي سيقان طويلة (GA_8 و GA_1 و GA_{20} و GA_{29}) وشكلين فقط من الجبرلين عند نبتة الجلبان ذي سيقان قصيرة (GA_{20} و GA_{29}).</p>	-I 1
0.75 ن	<p>- نستنتج أن سبب اختلاف طول سيقان نبتة الجلبانة مرتبط بتواجد أو غياب أحد أو كلا الهرمونين GA_1 و GA_8.</p>	
0.5 ن	<p>2 - الوثيقة 1: عدم توفر نبتة الجلبان ذي سيقان قصيرة على هرمون GA_8 الفعال لنمو طول السيقان. - الوثيقة 2: تركيب الهرمون GA_8 يتطلب تدخل 3β-hydroxylase الضروري لتحويل GA_1 إلى GA_8 الذي يعطي GA_8.</p>	2
0.5 ن	<p>- الوثيقة 3: اختلاف في تسلسل متتالية النكليوتيدات بين الحليلين (le) و (led) الناتج عن فقدان النكليوتيد C في الثلاثي 126 للمورثة (le). نتج عن هذه الطفرة تغير في متتالية النكليوتيدات.</p>	0.5 ن
0.75 ن	<p>- يرجع اختلاف طول السيقان إلى عدم تركيب الهرمون GA_8 من طرف نبتة الجلبان ذي سيقان قصيرة بسبب حدوث طفرة أدت إلى حذف النكليوتيد C، وبالتالي عدم تركيب الأنزيم 3β-hydroxylase المسؤول عن تركيب الهرمون GA_8 الفعال لنمو طول سيقان نبتة الجلبانة.</p>	0.75 ن
0.75 ن	<p>التزاوج الأول: - تجانس أفراد الجيل المحصل عليه يدل على أن الأباء A و D من سلالتين نقبتين بالنسبة للصفاتين. - الحليل المسؤول عن صفة الساق الطويل سائد والحليل المسؤول عن صفة الساق القصير متنحي. - الحليل المسؤول عن صفة لون الأزهار الحمراء سائد والحليل المسؤول عن صفة الأزهار البيضاء متنحي.</p>	-II 3
0.5 ن	<p>التزاوج الثاني: عدم تجانس الجيل المحصل عليه فيما يخص طول الساق يدل على أن النبتة B مختلفة الاقتران بالنسبة لهذه الصفة. تجانس الجيل المحصل عليه بالنسبة لصفة لون الأزهار يدل على أن النبتة B متشابهة الاقتران بالنسبة للون (الأحمر).</p>	0.5 ن
0.5 ن	<p>التزاوج الثالث: يدل الحصول على 4 مظاهر خارجية بنسب 25% لكل مظهر على أن النبتة C مختلفة الاقتران بالنسبة للصفاتين وعلى أن المورثتين المدروستين مستقلتان. (نتائج تزاوج اختباري).</p>	0.5 ن
1 ن	<p>الأنماط الوراثية : النبتة A: N/N R/R النبتة B: N/n R/R النبتة C: N/n R/r النبتة D: n/n r/r</p>	4- 1 ن
	<p>التزاوج الثاني: - النمط الوراثي للأباء: N/n R/R X n/n r/r</p>	ب-

- شبكة التزاوج:

الأمشاج	50% N/ R /	50% n/ R /
10 0% n/ r /	N//n R//r	n//n R//r
	50% [N , R]	50% [n ,R]

0.5 ن

التمرين الثالث (5 نقط)

1-1 - يلاحظ أن الياف عضلات عدائي المسافات الطويلة غنية بالشعيرات الدموية والميتوكوندريات وتحتوي على تركيز قوي من أنزيم MDH ؛ بينما تحتوي الياف عضلات عدائي المسافات القصيرة على عدد صغير من الشعيرات الدموية ومن الميتوكوندريات وتركيز قوي لأنزيم LDH؛ يبين الشكل 2 مسلكين لهدم حمض البيروفيك: مسلك التخمر ومسلك التنفس؛

0.5 ن

0.75 ن - دور أنزيم LDH هو تحفيز تفاعل تحول حمض البيروفيك إلى حمض لبنني، وذلك على مستوى الجبلة الشفافة...

0.75 ن - دور أنزيم MDH هو تحفيز تفاعلات هدم حمض البيروفيك الذي يعطي CO₂ و RH₂ وبالتالي فإن MDH تعمل على مستوى الماتريس (الميتوكوندري) .

0.5 ن

ب - الألياف المهيمنة عند عدائي المسافات الطويلة غنية بالميتوكوندريات وأنزيم MDH ، وبالتالي فإن طبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند عدائي هذه المسافات هي تفاعلات هي هوائية (أكسدة تنفسية)؛

0.5 ن

- الألياف المهيمنة عند عدائي المسافات القصيرة غنية بأنزيم LDH وتنفجر إلى الميتوكوندريات وبالتالي فإن طبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند هؤلاء العدائين هي تفاعلات هي لاهوائية (التخمر)

2 ن

2 - يؤدي استعمال EPO إلى الزيادة في عدد الكريات الحمراء وبالتالي نقل كميات مهمة من الأكسجين إلى الألياف العضلية وبالتالي إلى الميتوكوندري حيث يستعمل في تفاعلات السلسلة التنفسية، مما يرفع من كميات ATP المركبة والتي تزيد من تحسين الأداء الرياضي للعداء

التمرين الرابع (5نقط)

2 ن

1-1 - عند الانتقال من الجنوب إلى الشمال، يلاحظ ظهور البيوتيت ثم الدستين فالسليمانيت؛
- يفسر هذا التسلسل في تشكل المعادن بارتفاع تدريجي للضغط ودرجة الحرارة؛

1 ن

ب - تحول دينامي حراري (أو إقليمي) (+ التعليل)

2 ن

2 - المرحلة الأولى: تقارب الصفيحتين A و B وانغراز الغلاف الصخري المحيطي للصفيحة A تحت الغلاف الصخري القاري للصفيحة B؛
- المرحلتان الثانية والثالثة: تجابه الصفيحتين A و B نتيجة قوى انضغاطية، ظهور تشوهات وتشكل صفور متحولة؛
- نتج عن حركة الصفيحتين A و B ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة المسؤولين عن التحول الدينامي الحراري الذي عرفته المنطقة المدروسة.