

3- العمليات على المتاليات:

نعرف مجموع وجداء متاليتين وضرب عدد في متالية كما يلي:

$$(U_n)_{n \in I} + (V_n)_{n \in I} = (U_n + V_n)_{n \in I}$$

$$(U_n)_{n \in I} \cdot (V_n)_{n \in I} = (U_n \cdot V_n)_{n \in I}$$

$$\lambda (U_n)_{n \in I} = (\lambda U_n)_{n \in I}$$

(I) عموميات.

1- تعريف:

نسمى متالية عددية كل تطبيق u من جزء I من \mathbb{N} نحو \mathbb{R}

$$u : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \rightarrow u(n)$$

ترميز:

* نرمز ل (u_n) بالرمز u_n .

* نرمز للمتالية u بالرمز: $(U_n)_{n \in I}$

* u_n يسمى الحد ذات المدى n .

ملاحظة:

1- لا يجب الخلط بين: $(U_n)_{n \in I}$ التي تمثل التطبيق u الذي يمثل عدد حقيقي.

و $\{U_n\}_{n \in I}$ التي تمثل مجموعة القيم التي تأخذها المتالية.

2- نقول إن المتالية $(U_n)_{n \in I}$ ممتدة إذا كانت I ممتدة ونقول إنها غير ممتدة إذا كانت I غير ممتدة.

أمثلة:

نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث

$$u_3 = \sqrt{10}; u_2 = \sqrt{5}; u_1 = \sqrt{2}; u_0 = 1$$

نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث

$$u_3 = -1; u_2 = 1; u_1 = -1; u_0 = 1$$

$$\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{-1, 1\}$$

ملاحظة:

يمكن لمتالية أن تكون معرفة بالعبارة الصريحة لحدتها العام أو بالترجم وذلك حينما يتم حساب حد ما بالرجوع إلى حدود سابقة.

أمثلة:

نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث

$$u_1 = 2u_0 - 3$$

$$u_2 = 2u_1 - 3 = -5$$

نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث

$$u_2 = 2u_1 - u_0 = 3$$

$$u_3 = 2u_2 - u_1 = 4$$

2- تساوي متاليتين

تعريف:

نقول إن $(U_n)_{n \in I}$ و $(V_n)_{n \in J}$ متاليتين إذا وفقط إذا كان:

$$\begin{cases} I = J \\ (\forall n \in I) u_n = v_n \end{cases}$$

ملاحظة:

تكون المتالية $(U_n)_{n \in I}$ محدودة إذا وفقط إذا: $(\exists M > 0)(\forall n \in I) |u_n| \leq M$

أمثلة:

1- نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث $u_n = \frac{1}{n}$ لـ $n \geq 1$ لدينا:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) 0 < \frac{1}{n} \leq 1$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) 0 < u_n \leq 1$$

إذن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ محدودة.

2- نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$

$$|u_n| = \frac{1}{n^2 + 1}$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) n^2 \geq 0$$

$$n^2 + 1 \geq 1$$

$$\frac{1}{n^2 + 1} \leq 1$$

يعني:

يعني:
إذن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ محدودة.

$(\forall n \in \mathbb{N}) |u_n| \leq 1$

3- نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث:
 $u_0 = 3$
 $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$

لنبين أن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ مصغرورة ب 2:
 $(\forall n \in \mathbb{N}) 2 \leq u_n$

نستعمل الاستدلال بالترجع:
 $u_0 = 3 \geq 2$; $n = 0$
إذن من أجل $n = 0$ يعني $2 \leq u_0$.

نفترض أن الخاصية صحيحة من أجل $n \geq 2$
لنبين أنها صحيحة من أجل $n+1$ يعني $2 \leq u_{n+1}$.
لدينا: $u_n \geq 2$

$u_n + 2 \geq 4$
 $\sqrt{u_n + 2} \geq 2$
 $u_{n+1} \geq 2$ إذن

طريقة أخرى:

$$u_{n+1} - 2 = \sqrt{u_n + 2} - 2 \\ = \frac{(u_n + 2) - 4}{\sqrt{u_n + 2} + 2} = \frac{u_n - 2}{\sqrt{u_n + 2} + 2} \geq 0$$

لأن $u_n \geq 2$ إذن

$u_{n+1} \geq 2$ إذن
إذن الخاصية صحيحة من أجل $n+1$

$(\forall n \in \mathbb{N}) u_n \geq 2$ وبالتالي

ومنه $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ مصغرورة ب 2.

III المتالية الرتيبة:

تعريف:

نقول إن $(u_n)_{n \geq n_0}$

تراتبية، إذا وفقط إذا كان: $(\forall n \geq n_0) u_n \leq u_{n+1}$

تراتبية قطعاً: $(\forall n \geq n_0) u_n < u_{n+1}$

ثباتية: $(\forall n \geq n_0) u_n \geq u_{n+1}$

قطعاً: $(\forall n \geq n_0) u_n > u_{n+1}$

ثابتة إذا وفقط إذا كان: $(\forall n \geq n_0) u_n = u_{n+1}$

ملاحظة:

← من أجل دراسة رتبة المتالية (U_n) نقوم بدراسة إشارة:

$u_{n+1} - u_n$

إذا كان $0 \leq u_n - u_{n+1}$ فإن (U_n) تراتبية.

إذا كان $0 \leq u_n - u_{n+1}$ فإن (U_n) ثابتة.

← نقول إن المتالية (U_n) رتيبة إذا كانت تراتبية أو ثباتية.

← تكون المتالية $(u_n)_{n \geq n_0}$:

- تراتبية:

- ثباتية:

- ثابتة:

$(\forall p, q \geq n_0) p \leq q \Rightarrow u_p \leq u_q$

$p \leq q \Rightarrow u_p \geq u_q$

$p < q \Rightarrow u_p = u_q$

أمثلة:

$$1- نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث $u_n = 3n - 4$ لدرس رتبة (U_n) لدينا: $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - (3n - 4) = 3n + 3 - 3n + 4 = 3 > 0$ إذن (U_n) تزايدية قطعاً.$$

$$2- نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث: $u_0 = 3$ لدرس الرتبة: $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ لدينا: $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n \geq 2$ وجدنا سابقاً أن لدرس رتبة $(U_n)$$$

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 2} - u_n \\ = \frac{u_n + 2 - u_n^2}{\sqrt{u_n + 2} + u_n} \\ \text{لدرس إشارة: } -u_n^2 + u_n + 2 \\ \text{لدرس إشارة: } -x^2 + x + 2 \\ \Delta = 9$$

$$x_2 = -1 \quad ; \quad x_1 = 2$$

	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$-x^2 + x + 2$	-	0	+	0 -

ولدينا $2 \leq 0$ إذن: $u_n \geq 2$ ومنه $u_{n+1} - u_n \leq 0$ إذن (U_n) تناقصية.

طريقة أخرى:

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 2} - \sqrt{u_{n-1} + 2} \\ = \frac{u_n - u_{n-1}}{\sqrt{u_n + 2} + \sqrt{u_{n-1} + 2}} \quad \text{لدينا:} \\ \text{إذن إشارة } u_{n+1} - u_n \text{ هي إشارة } u_n - u_{n-1} \text{ له إشارة ثابتة هي إشارة } u_1 - u_0 \text{ إذن } u_{n+1} - u_n \leq 0 \text{ ولدينا:} \\ u_1 - u_0 = \sqrt{5} - 3 < 0 \quad \text{إذن} \\ u_{n+1} - u_n < 0 \quad \text{إذن} \\ \text{ولدينا:} \quad \text{ومنه} \\ \text{ومنه } (U_n) \text{ تناقصية.}$$

IV دراسة بعض المتاليات الترجعية:

1- المتاليات الحسابية:

(a) تعريف:

نقول إن المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ حسابية إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي r بحيث $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} = u_n + r$ - العدد r يسمى أساس هذه المتالية.
و u_0 الحد الأول لهذه المتالية.

ملاحظة:

- تكون المتالية (U_n) حسابية إذا وفقط إذا كان الفرق بين حدتين متتابعين ثابتاً وهذه الثابتة هي الأساس.
- كل متالية حسابية تكون معرفة بعدها الأول وأساسها. أو بحدها وأساسها.

أمثلة:

1- نعتبر المتتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بحيث: $u_n = -5n + 1$

لتبين أن (U_n) حسابية:

$$U_{n+1} - U_n = -5(n+1) + 1 - (-5n + 1) \\ = -5$$

إذن المتتالية (U_n) أساسها -5 وحدتها الأول: $u_0 = 1$

2- لتكن (U_n) متتالية حسابية أساسها 3 وحدتها

$$u_0 = -10$$

لحسب: u_5

$$u_{n+1} = u_n + r \\ u_{n+1} = u_n + 3$$

إذن:

$$u_1 = u_0 + 3 = -7$$

$$u_2 = u_1 + 3 = -4$$

$$u_3 = u_2 + 3 = -1$$

$$u_4 = u_3 + 3 = 2$$

$$u_5 = u_4 + 3 = 5$$

(b) خاصية مميزة:

نعتبر المتتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$(U_n) \Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) U_{n+1} - U_n = U_n - U_{n-1}$$

$$\Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) 2U_n = U_{n+1} + U_{n-1}$$

$$\Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) U_n = \frac{U_{n+1} + U_{n-1}}{2}$$

خاصية:

تكون المتتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ حسابية إذا وفقط إذا كان:

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) U_n = \frac{U_{n-1} + U_{n+1}}{2}$$

يعني $U_{n-1} + U_{n+1} = 2U_n$

ملاحظة:

تكون الأعداد a, b, c في هذا الترتيب ثلاثة حدود لمتتالية حسابية إذا وفقط إذا كان $a+c=2b$

(c) الحد العام لمتتالية حسابية:

لتكن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) U_{n+1} = U_n + r$$

$$u_1 = u_0 + r$$

$$u_2 = u_1 + r$$

$$u_3 = u_2 + r$$

.

.

.

$$u_n = u_{n-1} + r$$

جمع أطراف المقاوatas نحصل على:

$$u_n = u_0 + \underbrace{r + r + \dots + r}_{\text{مرة } n}$$

$$\cdot u_n = u_0 + nr$$

أي

خاصية:

لتكن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية حسابية أساسها r وحدتها الأول: u_0 .

$$(\forall n \in \mathbb{N}) U_n = U_0 + nr$$

لدينا:

ملاحظة:

إذا كان الحد الأول هو u_1 :

بصفة عامة: إذا كان u_p حد من متتالية حسابية أساسها r

فإن $u_n = u_p + (n-p)r$ ترتيب n غير مهم.

أمثلة:

1- لتكن (U_n) متتالية حسابية أساسها 4 وحدتها

$$u_1 = -10$$

لحسب u_{100}

$$u_{100} = u_1 + (100-1)r$$

لدينا:

$$= u_1 + 99r = -10 + 99 \times 4$$

$$= -10 + 396 = 386 = u_{100}$$

2- (U_n) متتالية حسابية أساسها -3 و $r = -100$

لحسب u_5

لدينا:

$$u_5 = u_20 + (5-20)r$$

$$= 100 + 45 = 145.$$

و

$$u_0 = u_5 + (0-5)r$$

$$= 145 + 15 = 160.$$

3- (U_n) متتالية حسابية حدها الأول U_0 وأساسها r بحيث

$$U_{20} = 100 \quad U_{10} = 30$$

حدد الحد العام:

لحدد: r

$$u_{20} = u_{10} + (20-10)r$$

$$r = \frac{u_{20} - u_{10}}{10} = \frac{100 - 30}{10}$$

$$= 7$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = u_{10} + (n-10)r$$

$$= 30 + 7n - 70$$

$$= 7n - 40$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = 7n - 40 \quad \text{إذن}$$

(d) مجموع حدود متتابعة متتالية حسابية:

لتكن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية حسابية أساسها r وحدتها الأول: u_0

لحسب $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \dots + u_k + \dots + u_{n-1} + u_n$

$S = u_n + u_{n-1} + u_{n-2} + \dots + u_{n-k} + \dots + u_0$ و

$2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + \dots + (u_k + u_{n-k}) + \dots + (u_n + u_0)$

$$u_k = u_0 + kr$$

$$u_{n-k} = u_0 + (n-k)r$$

$$u_k + u_{n-k} = u_0 + u_0 + nr$$

$$= u_0 + u_n$$

$$(\forall k \in \mathbb{N}) u_k + u_{n-k} = u_0 + u_n \quad \text{إذن}$$

$$2S = \underbrace{(u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + \dots + (u_0 + u_n)}_{\text{أي}}$$

2- المتتالية الهندسية:

(a) تعريف:

نقول إن المتتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي q بحيث: $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = q \cdot u_n$. يسمى أساس (U_n) بـ q .

ملاحظات:

- * تكون متتالية التي حدودها غير منعدمة هندسية إذا وفقط إذا كان خارج حدين متتابعين ثابت.
- * تكون المتتالية هندسية معرفة بأحد حدودها وأساسها.
- * إذا كان $0 = u_0$ فإن $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = 0$
- * إذا كان $0 = q$ فإن $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = u_0$
- * إذا كان $1 = q$ فإن $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = u_0$

(b) خاصية مميزة:

تكون المتتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ هندسية إذا وفقط إذا كان: $u_{n+1} \cdot u_{n-1} = u_n^2$

ملاحظة:

تكون الأعداد c, b, a في هذا الترتيب ثلاثة حدود متتابعة لمتتالية هندسية إذا وفقط إذا كان: $a \cdot c = b^2$

(c) الحد العام لمتتالية هندسية:

لتكن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية هندسية أساسها $0 \neq q$ وحدتها الأول $u_0 \neq 0$ لحسب u_n بدلالة n :

$$\begin{aligned} (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} &= q u_n && \text{لدينا} \\ u_1 &= q u_0 && \text{إذن} \\ u_2 &= q u_1 \\ &\vdots \\ &\vdots \\ u_n &= q u_{n-1} \end{aligned}$$

بضرب أطراف المتساويات نجد: $u_n = u_0 \cdot q^n$ إذن وهذه العلاقة تبقى صحيحة إذا كان $0 = u_0$ أو $q = 0$

خاصية:

لتكن $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ مجموعة هندسية أساسها q وحدتها الأول u_0 لحسب: $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = u_0 \cdot q^n$ إذن:

ملاحظة:

إذا كان u_1 هو الحد الأول: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

بصفة عامة: إذا كان u_p حدين من مجموعة هندسية أساسها q فإن: $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$ (ترتيب p غير مهم).

(d) مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية:

لتكن (u_n) متتالية هندسية أساسها q وحدتها الأول u_0

لحسب: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

* إذا كان $1 = q$ فإن: $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = u_0$

$$S = \underbrace{u_0 + u_0 + \dots + u_0}_{n+1 \text{ مرة}} = (n+1)u_0 \quad \text{إذن}$$

$$2S = (u_0 + u_n)(n+1) \quad \text{إذن:}$$

$$S = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$$

خاصية:

لتكن (U_n) متتالية حسابية أساسها r وحدتها الأول u_0 لدينا:

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = (n+1) \frac{(u_0 + u_n)}{2}$$

u_0 الحد الأول للمجموع

u_n الحد الأخير للمجموع

$n+1$ عدد حدود المجموع

ملاحظة:

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = n \cdot \frac{u_1 + u_n}{2}$$

$$u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = (n-p+1) \frac{(u_p + u_n)}{2}$$

أمثلة:

| (1) أحسب: $S = 43 + 47 + 51 + \dots + 203$ نلاحظ أن S هو مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية أساسها $4 = u_0$ وحدتها الأول $43 = r$ نحسب $u_n = 203$ ولنحدد

نعلم أن: $u_n = u_0 + nr$

$u_n = 43 + 4n$

$u_n = 203 \Leftrightarrow 4n = 203 - 43$ إذن

$$\Leftrightarrow n = \frac{160}{4} = 40 \quad 203 = u_{40} \quad \text{إذن}$$

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{40} = (40+1) \frac{u_0 + u_{40}}{2} = 41 \cdot \frac{43+203}{2} \quad \text{إذن:}$$

$S = 5043 \quad \text{إذن}$

| (2) لنحسب $S = 1 + 2 + \dots + n$ نلاحظ أن S هو مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية أساسها $1 = u_0$ وعدد حدوده هو n .

$$S = n \cdot \frac{1+n}{2} \quad \text{إذن}$$

$$1 + 2 + \dots + n = n \left(\frac{1+n}{2} \right) \quad \text{أي}$$

| (3) لنحسب $S = 2 + 4 + \dots + 2n$ نلاحظ أن S هو مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية أساسها $2 = u_0$ وعدد حدوده هو n .

$$S = n \cdot \frac{2+2n}{2} = n(1+n) \quad \text{إذن}$$

لتحسب $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ متتابعة لمتتالية حسابية

أساسها $2 = u_0$ عدد حدوده هو n .

لتحسب $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ متتابعة لمتتالية حسابية

أساسها $2 = u_0$ عدد حدوده هو n .

لتحسب $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ متتابعة لمتتالية حسابية

أساسها $2 = u_0$ عدد حدوده هو n .

لتحسب $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ متتابعة لمتتالية حسابية

أساسها $2 = u_0$ عدد حدوده هو n .

$$\alpha = \frac{b}{1-a}$$

إذن توجد متتالية ثابتة وحيدة تتحقق (1) هي $u_n = \alpha$ مع

* لندد جميع المتتاليات التي تتحقق (1)

$$\text{لدينا: } \alpha = a\alpha + b$$

$$\text{يعني: } b = \alpha - a\alpha$$

$$((1) \text{ تتحقق } (U_n)) \Leftrightarrow u_{n+1} = au_n + b$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} = au_n + b$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} - \alpha = a(u_n - \alpha)$$

$$\text{نضع } \nu_n = u_n - \alpha$$

$$\Leftrightarrow \nu_{n+1} = a\nu_n$$

$$\text{لدينا: } \text{إذن } (\nu_n) \text{ هندسية أساسها } a.$$

$$\nu_n = v_0 \cdot q^n$$

$$\text{لدينا: } \nu_n = v_0 \cdot a^n$$

$$\text{ويعني: } \nu_n = (u_0 - \alpha) a^n$$

$$\text{لدينا: } \nu_n = u_n - \alpha$$

$$\text{يعني: } u_n = \nu_n + \alpha$$

$$\text{يعني: } u_n = (u_0 - \alpha) a^n + \alpha$$

$$\text{إذن المتتاليات التي تتحقق (1) هي: } u_n = (u_0 - \alpha) a^n + \alpha$$

$$\text{حيث: } x = ax + b \text{ حل للمعادلة } x = \alpha \text{ مع } a \neq 0, b \neq 0.$$

خاصية:

من أجل البحث عن جميع المتتاليات التي تتحقق

$$b \neq 0, a \neq 1 \text{ مع } u_{n+1} = au_n + b$$

نقوم بحل المعادلة $x = ax + b$ ليكن α حلها.

نضع $v_n = u_n - \alpha$ ثم نبين أن (v_n) هندسية أساسها سيكون v

نستنتج الحد العام ل (v_n) ثم نستنتج الحد العام ل (u_n) .

مثال:

حدد الحد العام للمتتالية (u_n) :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$$

لتحل المعادلة $x = 2x - 3$

$$\text{يعني: } x = 3$$

نضع $v_n = u_n - 3$ لنبين أن (v_n) هندسية.

$$\text{لدينا: } v_{n+1} = u_{n+1} - 3$$

$$= 2u_n - 3 - 3$$

$$= 2u_n - 6$$

$$= 2(u_n - 3) = 2v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها 2 وحدتها الأولى: -2

$$\text{لدينا: } v_n = v_0 \cdot q$$

$$= -2 \cdot 2^n$$

$$v_n = -2^{n+1}$$

$$\text{لدينا: } u_n = v_n + 3 \quad \text{يعني: } v_n = u_n - 3$$

$$u_n = -2^{n+1} + 3 \quad \text{يعني: } v_n = -2^{n+1}$$

* إذا كان $1 \neq q$ فإن:

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

$$u_k = u_0 q^k$$

$$(1) S = u_0 + u_0 q + u_0 q^2 + \dots + u_0 q^{n-1} + u_0 q^n$$

$$(2) qS = u_0 q + u_0 q^2 + u_0 q^3 + \dots + u_0 q^n + u_0 q^{n+1}$$

من (2) - (1) نجد:

$$S - qS = u_0 - u_0 q^{n+1}$$

$$S = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad \text{يعني:}$$

خاصية:

لتكن (U_n) متتالية هندسية أساسها q وحدتها الأولى

لدينا:

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \begin{cases} u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}; & q \neq 1 \\ (n+1)u_0; & q = 1 \end{cases}$$

u_0 : الحد الأول للمجموع

$.S$: عدد حدود المجموع $(n+1)$

ملاحظة:

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$.u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = u_p \cdot \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \quad \text{صفة عامة:}$$

أمثلة:

$$S = 3 + 3 \times 2 + 3 \times 2^2 + \dots + 3 \times 2^n \quad (1) \text{ لاحسب:}$$

نلاحظ أن S هو مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية أساسها

$n+1$ وعدد حدوده: $q = 2$

$$S = 3 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} \quad \text{إذن:}$$

$$= 3 \cdot \frac{1 - 2^{n+1}}{-1} = -3(1 - 2^{n+1}) = 3(2^{n+1} - 1)$$

$$S = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n \quad (2) \text{ لين } x \neq 1 \text{ لاحسب:}$$

نلاحظ أن S هو مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية أساسها α وعدد حدوده: $n+1$.

$$S = 1 \cdot \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \quad \text{إذن:}$$

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \quad \text{إذن}$$

-3 المتتالية التي تتحقق:

نعتبر العلاقة $b \neq 0, U_{n+1} = au_n + b$ مع $a \neq 0, a \neq 1$

* لندد المتتاليات الثابتة التي تتحقق العلاقة (1):

نضع $(\forall n \in \mathbb{N}) U_n = \alpha$

((1) تتحقق (U_n)) $\Leftrightarrow u_{n+1} = au_n + b$

$$\Leftrightarrow \alpha = a\alpha + b$$

$$\Leftrightarrow (1-a)\alpha = b$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{b}{1-a}$$

$$\begin{aligned} (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n v_{n+1} - v_n u_{n+1} &= 0 && \text{يعني} \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \frac{u_n}{v_n} = \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} & && \text{يعني} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\forall n \in \mathbb{N}) \frac{u_n}{v_n} = \gamma & \quad \text{هذا يعني أن } \frac{u_n}{v_n} \text{ ثابتة يعني:} \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = \gamma v_n & \quad \text{يعني:} \\ \text{و هذا تناقض لأن } (u_n) \text{ و } (v_n) \text{ غير متناسبين.} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{إذن } 0 \neq \Delta_0 \text{ ومنه: } (\forall n \in \mathbb{N}) \Delta_n \neq 0 & \\ \text{إذن النقطة } (S) \text{ تقبل حلاً وحيداً. } (\alpha, \beta) & \\ \text{لنبين أن } \alpha \text{ و } \beta \text{ لا يتعلّقان بـ } n: & \end{aligned}$$

$$\Delta_n^\alpha = \begin{vmatrix} w_n & v_n \\ w_{n+1} & v_{n+1} \end{vmatrix} = w_n \cdot v_{n+1} - w_{n+1} \cdot v_n$$

بنفس الطريقة ننبين أن (Δ_n^α) هندسية أساسها $-b$

$$\Delta_n^\alpha = \Delta_0^\alpha \cdot (-b)^n \quad \text{إذن}$$

$$\alpha = \frac{\Delta_n^\alpha}{\Delta_0} = \frac{\Delta_0^\alpha (-b)^n}{\Delta_0 (-b)^n} \quad \text{إذن}$$

$$= \frac{w_0 v_1 - w_1 v_0}{u_0 v_1 - u_1 v_0}$$

إذن α ثابتة، وبنفس الطريقة ننبين أن β ثابتة.

إذن يوجد α و β من \mathbb{R} بحيث: $w_n = \alpha u_n + \beta v_n$. وبالتالي المتاليات التي تحقق (1) هي المتاليات التي تكتب على شكل $w_n = \alpha u_n + \beta v_n$.

(b) البحث عن المتاليات التي تتحقق (1):

لبحث عن المتاليات الهندسية التي تتحقق (1)

$$\begin{aligned} \text{لتكن } (U_n) \text{ أساسها } 0 \text{ و } q \neq 0 \text{ إذن} \\ (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = u_0 \cdot q^n \quad \text{لدينا} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{إذن } (U_n) \text{ تتحقق (1)} \Leftrightarrow u_{n+2} &= au_{n+1} + bu_n \\ \Leftrightarrow u_0 \cdot q^{n+2} &= a \cdot u_0 \cdot q^{n+1} + b u_0 \cdot q^n \\ \Leftrightarrow u_0 \cdot q^n (q^2 - aq - b) &= 0 \\ \Leftrightarrow q^2 - aq - b &= 0 \end{aligned}$$

تعريف:

المعادلة $q^2 - aq - b = 0$ تسمى المعادلة المميزة للعلاقة (1).

نعتبر إذن المعادلة

$$\Delta = a^2 + 4b$$

إذن كان $\Delta \neq 0$ فإن (E) تقبل حللين حقيقيين مختلفين q_1 و q_2 .

إذن: $v_n = q_1^n$ و $u_n = q_1^n$ تتحققان (1)

$$q_1 \neq q_2 \quad \frac{V_n}{U_n} = \left(\frac{q_2}{q_1} \right)^n \neq cte \quad \text{ولدينا:}$$

إذن (u_n) و (v_n) غير متناسبين.

إذن المتاليات التي تتحقق (1) هي:

$$w_n = \alpha u_n + \beta v_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$$

إذن كان $\Delta = 0$ فإن (E) تقبل حلاً وحيداً:

إذن المتالية $u_n = q^n$ تتحقق العلاقة (1)

نضع $v_n = nu_n$ لنبين أن (V_n) تتحقق (1)

4- المتاليات التي تتحقق:

$b \neq 0, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$: تعتبر العلاقة (1) ممتاليتان تتحققان العلاقة (1) فإن كل متالية

على شكل: $w_n = \alpha u_n + \beta v_n$ حيث $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

برهان:

نفترض أن (u_n) و (v_n) تتحققان (1)

نضع $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ مع $w_n = \alpha u_n + \beta v_n$ لنبين أن (w_n) تتحقق العلاقة (1)

لدينا: $w_{n+2} = aw_{n+1} + bw_n$

$$\begin{aligned} w_{n+2} &= \alpha u_{n+2} + \beta v_{n+2} \\ &= \alpha (au_{n+1} + bu_n) + (av_{n+1} + bv_n) \\ &= a(\alpha u_{n+1} + \beta v_{n+1}) + b(\alpha u_n + \beta v_n) \\ &= aw_{n+1} + bw_n \end{aligned}$$

إذن (w_n) تتحقق (1).

خاصية (2):

إذن كانت (U_n) و (V_n) ممتاليتين تتحققان (1) وغير متناسبين

(لا يوجد γ بحيث $\frac{v_n}{u_n} = \gamma$ في كل $n \in \mathbb{N}$) يعني

المتاليات التي تتحقق (1) هي المتاليات التي تكتب على شكل

$$\cdot (\alpha, \beta \in \mathbb{R}) \quad w_n = \alpha u_n + \beta v_n$$

برهان:

لتكن (u_n) و (v_n) غير متناسبين وتحقيق (1) وجدنا من خلال ما سبق أن كل متالية على شكل:

$$\cdot w_n = \alpha u_n + \beta v_n \text{ تتحقق (1).}$$

عكسياً: لتكن (w_n) متالية تتحقق (1)

لنبين أنه يوجد α و β من \mathbb{R} بحيث

$$\cdot (\forall n \in \mathbb{N}) \quad w_n = \alpha u_n + \beta v_n \quad \text{لدينا:}$$

إذن:

$$\begin{cases} w_n = \alpha u_n + \beta v_n \\ w_{n+1} = \alpha u_{n+1} + \beta v_{n+1} \end{cases}$$

نحصل إذن على النقطة: $\begin{cases} \alpha u_n + \beta v_n = w_n \\ \alpha u_{n+1} + \beta v_{n+1} = w_{n+1} \end{cases}$

مجاهلهما هما α و β :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} u_n & v_n \\ u_{n+1} & v_{n+1} \end{vmatrix} = u_n v_{n+1} - v_n u_{n+1} \quad \text{لدينا:}$$

$$\Delta_{n+1} = u_{n+1} \cdot v_{n+2} - v_{n+1} \cdot u_{n+2} \quad \text{لدينا:}$$

$$u_{n+1} (av_{n+1} + bv_n) - v_{n+1} (au_{n+1} + bu_n) \quad \text{لدينا:}$$

$$\Delta_{n+1} = bu_{n+1} \cdot v_n - bv_{n+1} \cdot u_n \quad \text{لدينا:}$$

$$= -b(u_n \cdot v_{n+1} - v_n \cdot u_{n+1}) = -b\Delta_n \quad \text{لدينا:}$$

إذن (Δ_n) هندسية أساسها $-b$ وحدتها الأولى Δ_0 .

$$\Delta_n = \Delta_0 \cdot q^n = (-b)^n \cdot \Delta_0$$

لنبين أن $\Delta_0 \neq 0$

نفترض العكس يعني $\Delta_0 = 0$

إذن

$$(\forall n \in \mathbb{N})$$

$$\Delta_n = 0$$

خاصية:

نعتبر العلاقة $(b \neq 0) u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$

لتكن $q^2 - aq - b = 0$ المعادلة المميزة ل (1)

$$\Delta = a^2 + 4b$$

ليكن

إذا كان $\Delta < 0$ فإن E تقبل حلين حقيقيين مختلفين q_1, q_2 . وتكون

المتتاليات التي تحقق العلاقة (1) هي المتتاليات التي تكتب على

شكل: $w_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$ حيث $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

إذا كان $\Delta = 0$ فإن E تقبل حلًا واحدًا q .

وتكون المتتاليات التي تتحقق (1) هي المتتاليات التي تكتب على

شكل: $w_n = (\alpha + \beta n)q^n$ حيث $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$.

إذا كان $\Delta > 0$ فإن E تقبل حلين عقديين مترافقين $q \pm ie^{i\theta}$

وتكون المتتاليات التي تتحقق (1) هي المتتاليات التي تكتب على

شكل: $w_n = r^n(\alpha \cos n\theta + \beta \sin n\theta)$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$).

تمرين تطبيقي:

حدد الحد العام للمتتالية (U_n) في الحالات التالية:

$$\begin{cases} u_0 = 1, & u_1 = -1 \\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n & -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_0 = 1, & u_1 = 2 \\ u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n & -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_0 = 1, & u_1 = -1 \\ u_{n+2} = u_{n+1} - u_n & -3 \end{cases}$$

$(E): q^2 - 5q + 6 = 0$ المعادلة المميزة هي: -1
 $\Delta = 25 - 24 = 1$

$$q_1 = 2 ; q_2 = 3$$

$w_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$ إذن:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ 2\alpha + 3\beta = -1 \end{cases} \text{ يعني} \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -1 \end{cases} \text{ ولدينا:}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$\Delta_\alpha = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 1 = 4$$

$$\Delta_\beta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3$$

$$\begin{cases} \alpha = 4 \\ \beta = -3 \end{cases} \text{ إذن}$$

$$u_n = 4 \cdot 2^n - 3 \cdot 3^n \text{ إذن}$$

$$u_n = 2^{n+2} - 3^{n+1} \text{ إذن}$$

$(E): q^2 - 6q + 9 = 0$ المعادلة المميزة هي: -2

$$\Delta = 36 - 36 = 0 \quad : (E) \text{ لحل}$$

$$q = \frac{6}{2} = 3 \quad \text{إذن}$$

$$u_n = (\alpha + \beta n) \cdot 3^n \quad \text{إذن:}$$

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ 3(\alpha + \beta) = 2 \end{cases} \text{ يعني} \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \end{cases} \text{ ولدينا:}$$

يعني لدينا: $v_{n+2} = av_{n+1} + bv_n$

$$v_{n+2} - (av_{n+1} + bv_n) = (n+2)q^{n+2} - a(n+1)q^{n+1} - bnq^n$$

$$= nq^{n+2} + 2q^{n+2} - anq^{n+1} - aq^{n+1} - bnq^n$$

$$= nq^n \underbrace{(q^2 - aq - b)}_{0} + q^{n+1}(2q - a) = 0$$

$$\text{لأن } q^2 - aq - b = 0 \quad \text{أي } q = \frac{a}{2}$$

إذن (V_n) تتحقق (1).

ولدينا $\frac{V_n}{U_n} = n \neq cste$ إذن (u_n) و (v_n) غير متاسبتين. وبالتالي

المتتاليات التي تتحقق (1) على التي تكتب على شكل:

$$w_n = \alpha u_n + \beta v_n$$

$$= \alpha q^n + \beta n \cdot q^n$$

$$w_n = (\alpha + \beta n)q^n \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

إذا كان $\Delta < 0$ فإن E تقبل حلين عقديين مترافقين في \mathbb{C} هما:

$$\bar{q}, q \neq e^{i\theta}$$

$$q^2 - aq - b = 0 \quad \text{لدينا:}$$

$$q^{n+2} - aq^{n+1} - bq^n = 0 \quad \text{يعني}$$

$$r^{n+2} \cdot e^{i(n+2)\theta} - a \cdot r^{n+1} \cdot e^{i(n+1)\theta} - br^n \cdot e^{in\theta} = 0 \quad \text{يعني}$$

$$\Leftrightarrow r^{n+2} (\cos((n+2)\theta) + i \sin((n+2)\theta))$$

$$- ar^{n+1} (\cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta))$$

$$- br^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = 0$$

$$\Leftrightarrow [r^{n+2} \cos((n+2)\theta) - ar^{n+1} \cos((n+1)\theta) - br^n \cos n\theta]$$

$$+ i[r^{n+2} \sin((n+2)\theta) - ar^{n+1} \sin((n+1)\theta) - br^n \sin n\theta] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r^{n+2} \cos((n+2)\theta) = ar^{n+1} \cos((n+1)\theta) + br^n \cos n\theta \\ r^{n+2} \sin((n+2)\theta) = ar^{n+1} \sin((n+1)\theta) + br^n \sin n\theta \end{cases} *$$

$$u_n = r^n \cos n\theta$$

$$v_n = r^n \sin n\theta$$

نضع:

و

$$* \Leftrightarrow \begin{cases} u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \\ v_{n+2} = av_{n+1} + bv_n \end{cases}$$

إذن (u_n) و (v_n) تحققان العلاقة (1)

$$\frac{v_n}{u_n} = tg(n\theta) \neq cste \quad \text{لدينا:}$$

إذن (V_n) غير متاسبتين.

وبالتالي المتتاليات التي تتحقق (1) هي:

$$w_n = \alpha u_n + \beta v_n \quad w_n = \alpha u_n + \beta v_n$$

$$= \alpha(r^n \cos n\theta) + \beta(r^n \sin n\theta)$$

$$= r^n(\alpha \cos n\theta + \beta \sin n\theta)$$

أي

$$(\forall A \rangle 0) (n_0 \in \mathbb{N}^*) : n \rangle n_0 \Rightarrow u_n \rangle A \quad \text{إذن:}$$

$$\lim U_n = +\infty \quad \text{إذن:}$$

بنفس الطريقة نبين أن:

$$(p \in \mathbb{N}^*) \lim n^p = +\infty; \lim \frac{1}{n} = 0; \lim \sqrt[p]{n} = +\infty$$

ملاحظة

$$\lim |u_n| = 0 \Leftrightarrow \lim u_n = 0 \quad \leftarrow$$

$$\lim (u_n - l) = 0 \Leftrightarrow \lim u_n = l \quad \leftarrow$$

$$\lim |u_n - l| = 0 \Leftrightarrow \lim u_n = l \quad \leftarrow$$

والعكس خاطئ $\lim u_n = l \Rightarrow \lim |u_n| = |l| \quad \leftarrow$

مثال: نعتبر $u_n = (-1)^n$

$$\lim |u_n| = 1 \quad \text{إذن} \quad |u_n| = 1$$

لكن (U_n) لا تقبل نهاية.

2- مصادق التقارب:

خاصية:

(1) لتكن (U_n) و (V_n) متتاليتين بحيث: $|u_n - l| \leq v_n$ انطلاقاً من صف ما.

$$\lim v_n = 0 \Rightarrow \lim u_n = l \quad \text{لدينا:}$$

(2) لتكن (U_n) و (V_n) متتاليتين بحيث: $u_n \leq v_n$ انطلاقاً من صف ما:

$$\lim u_n = +\infty \Leftrightarrow \lim v_n = +\infty$$

$$\lim v_n = -\infty \Leftrightarrow \lim u_n = -\infty$$

(3) لتكن (w_n) ثالث متتاليات بحيث:

إذا كانت (w_n) منقاربتين ولهم نفس النهاية l فإن:

$$\lim u_n = l \quad \text{مقاربة} \quad \text{و} \quad \lim w_n = l \quad \text{مقاربة}$$

أمثلة:

$$U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \quad \text{- نعتبر المتالية}$$

$$u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{لدينا:} \\ \text{ليكن } n \in \mathbb{N}^*$$

$$(\forall K \in \{1, 2, 3, \dots, n\}) : \quad \text{لدينا:}$$

$$\sqrt{1} \leq \sqrt{K} \leq \sqrt{n}$$

$$(\forall K \in \{1, 2, 3, \dots, n\}) \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{K}} \leq 1 \quad \text{يعني}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sum_{k=1}^n 1 \quad \text{إذن}$$

$$n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \leq u_n \leq n \quad \text{يعني}$$

$$\sqrt{n} \leq u_n \leq n \quad \text{يعني}$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad \sqrt{n} \leq u_n \quad \text{إذن}$$

$$\lim u_n = +\infty \quad \text{لدينا} \quad \lim \sqrt{n} = +\infty$$

2- نعتبر المتالية:

$$U_n = q^n \quad \text{إذا كان } q > 1$$

* نضع $q = 1 + a$ مع $a > 0$ يعني

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -\frac{1}{3} \end{cases} \quad \text{يعني}$$

$$u_n = \left(1 - \frac{1}{3}n\right) 3^n \quad \text{إذن:}$$

3- المعادلة المميزة هي:

$$\Delta = 1 - 4 = -3 \quad \text{لحل (E)}$$

$$q_2 = \bar{q}_1 \quad ; \quad q_1 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{إذن:}$$

$$q_1 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}} \quad \text{لدينا:}$$

$$u_n = 1^n \left(\alpha \cos n \frac{\pi}{3} + \beta \sin n \frac{\pi}{3} \right) \quad \text{إذن:}$$

$$u_n = \alpha \cos n \frac{\pi}{3} + \beta \sin n \frac{\pi}{3} \quad \text{يعني:}$$

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha \cos \frac{\pi}{3} + \beta \sin \frac{\pi}{3} = -2 \end{cases} \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -2 \end{cases} \quad \text{ولدينا:}$$

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -\frac{5}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} \alpha = 1 \\ \frac{1}{2}\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\beta = -2 \end{cases} \quad \text{يعني:}$$

$$u_n = \cos n \frac{\pi}{3} - \frac{5\sqrt{3}}{3} \sin n \frac{\pi}{3} \quad \text{إذن:}$$

V- نهاية متتالية:

1- تعريف

نعتبر المتالية $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$

نقول إن المتالية (U_n) تؤول إلى $+\infty$ إذا وفقط إذا كان:

$$(\forall A \rangle 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}^*) : n \rangle n_0 \Rightarrow U_n \rangle A$$

ونكتب: $\lim U_n = +\infty$

نقول إن المتالية (U_n) تؤول إلى $-\infty$ إذا وفقط إذا كان:

$$(\forall A \rangle 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}^*) : n \rangle n_0 \Rightarrow U_n \langle -A$$

ونكتب: $\lim U_n = -\infty$

نقول إن المتالية (U_n) تؤول إلى العدد الحقيقي l إذا وفقط إذا

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}^*) : n \rangle n_0 \Rightarrow |u_n - l| < \varepsilon$$

ونكتب: $\lim U_n = l$ ونقول في هذه الحالة إن المتالية (U_n) متبااعدة إذا وفقط إذا كانت غير مقارة.

مثال:

نعتبر المتالية: $U_n = \sqrt{n}$

لنبين أن $\lim U_n = +\infty$ يعني: $\lim U_n = +\infty$

ليكن: $A \rangle 0$ لنبحث عن $n_0 \in \mathbb{N}^*$ بحيث $u_{n_0} \rangle A$

لدينا $u_{n_0} \rangle A$

يعني $n_0 \rangle A^2$ يكفي أن نأخذ

$$n_0 = E(A^2) + 1$$

مثلا: $n_0 \rangle n_0 \Rightarrow n \rangle A^2$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \rangle A$$

$$\Rightarrow u_{n_0} \rangle A$$

$$v_n - u_n = \frac{n! + n+1}{(1+n)!} = \frac{n!}{(1+n)!} + \frac{n+1}{(1+n)!}$$

$$= \frac{1}{1+n} + \frac{1}{n!}$$

لدينا: $n(n-1)! \geq n$ إذن $(n-1)! \geq 1$
 $n! \geq n$ أي $0 < \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{n}$ يعني

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \text{ولدينا}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0 \quad \text{إذن}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+n} = 0 \quad \text{وأيضاً}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (v_n - u_n) = 0 \quad \text{إذن}$$

ومنه (U_n) و (V_n) متحاديتان.

- المتاليات الترجعية. VII

مثال:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n} \end{cases} \quad \text{نعتبر المتالية:}$$

لدرس سلوك المتالية (U_n)


$$f(x) = \frac{x+2}{x} \quad \text{نعتبر الدالة:}$$

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{إذن } (U_n) \text{ تصبح:}$$

لتنشئ f' :

$$D_f = \mathbb{R}^*$$

$$f'(x) = -\frac{2}{x^2}$$



$l \neq 0$	0	∞
l	∞	0
∞	∞	شكل غير محدد
0	0	شكل غير محدد

VI - المتاليات المتحادية:

تعريف:

نقول إن (V_n) و (U_n) متحاديتان إذا وفقط إذا كان:

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_n \leq V_n \quad (*)$$

(U_n) تزايدية و (V_n) تناسبية.

$$\cdot \lim(V_n - U_n) = 0 \quad (**)$$

خاصية:

إذا كانت (U_n) و (V_n) متحاديتين فإنهما متقاربتان ولهم نفس النهاية.

برهان: لدينا $U_n \leq V_n$

لدينا (U_n) تزايدية إذن

$(\forall n \in \mathbb{N}) v_n \leq v_0$ إذن (V_n) تناسبية إذن

$(\forall n \in \mathbb{N}) u_0 \leq u_n \leq v_0$ إذن v_0 متقاربة.

إذن (U_n) تزايدية ومكبورة ب v_0 إذن متقاربة.

(V_n) تناسبية ومصغرفة ب u_0 إذن متقاربة.

لدينا $\lim(v_n - u_n) = 0$

يعني $\lim v_n - \lim u_n = 0$

أي $\lim v_n = \lim u_n$ إذن (V_n) متقاربتان ولهم نفس النهاية.

مثال:

$$v_n = 1 + \frac{1}{n!} \quad ; \quad u_n = \frac{n}{1+n} \quad \text{نعتبر المتاليتين:}$$

لتبين أن (U_n) و (V_n) متحاديتان.

$$v_n - u_n = 1 + \frac{1}{n!} - \frac{n}{1+n} \quad \text{لدينا:}$$

$$= \frac{(1+n)! + (1+n) - n(n!)}{(1+n)!} = \frac{(1+n)n! + (1+n) - n(n!)}{(1+n)!}$$

$$= \frac{n! + n + 1}{(1+n)!} > 0$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n < v_n \quad \text{إذن:}$$

$$v_{n+1} - v_n = 1 + \frac{1}{(n+1)!} - 1 - \frac{1}{n!}$$

$$= \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{(n+1)} - 1 \right) = \frac{1}{n!} \left(\frac{-n}{n+1} \right) < 0$$

إذن (V_n) تناسبية.


* لدينا:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}$$

$$= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} < 0$$

إذن (U_n) تزايدية.

* لحسب: $\lim(v_n - u_n)$



من خلال التمثيل المباني يتبين أن سلوك المتتالية كالتالي:
- (U_n) ليس رتيبة.

- (U_n) مصغررة بـ u_0 ومكورة بـ u_1

- $f(x) = 2$ الذي هو حل المعادلة $x = x$

- المتتالية: $v_n = u_{2n}$ تزايدة.

- المتتالية: $w_n = u_{2n+1}$ تنقصية.

- $(\forall n \in \mathbb{N}) v_n < w_n$

- (w_n) متحاديتان.

ثم نقوم بالبرهان على هذه النتائج.

خاصية:

لتكن f دالة معرفة على مجال I ونعتبر المتتالية:

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

إذا كانت $I \subset f(I)$ فإن المتتالية معرفة.

إذا كانت f متصلة على I و (u_n) متقاربة فإن نهايتها l تتحقق

$$f(l) = l$$

